

Gélinotte huppée




environ 45 cm
530 g ♀
620 g ♂



CARACTÉRISTIQUES



- Petite huppe;
- Ailes, queue et dos bruns ou roux;
- Ventre blanc avec des rayures brunes;
- Large queue avec une bande noire au bout.



© Pierre Blanchette

RÉPARTITION AU QUÉBEC

Ensemble du Québec forestier.



Mi-juillet à mi-août
Implantation*: hiver

Naissances : fin mars à début avril
1 portée/an
1 à 5 petits

Élevage des jeunes : Avril à octobre

*Implantation des foetus selon les conditions environnementales (dépend de la disponibilité de nourriture).



ALIMENTATION

- Poussins : insectivores;
- Adultes : plantes vertes, feuilles, bourgeons, ramilles, petits fruits, faines, glands, etc.



HABITAT

- Change selon les saisons;
- Domaine vital : ♂ 22 ha
♀ 45 ha.



ABRI D'HIVER

Période : octobre à avril
Domaine vital moyen : 4 ha
Composition forêt : feuillue ou mixte
Hauteur des arbres : > 7 m
Densité du couvert : forte à moyenne
La composition mixte du peuplement lui permet de s'alimenter et de s'abriter dans les conifères (îlots denses, branches basses) sans trop se déplacer, afin d'économiser son énergie et de se protéger des prédateurs.



NIDIFICATION

Période : mai à juillet
Domaine vital moyen : 1 ha
Composition forêt : feuillue ou mixte
Hauteur des arbres : > 17 m
Densité du couvert : peu dense
Les femelles nichent au sol, souvent au pied d'un gros arbre ou sous des arbres tombés.



REPRODUCTION

Période : avril à mai
Domaine vital : variable selon sexe et âge
Composition forêt : mixte et jeune
Hauteur des arbres : 7 à 17 m
Densité du couvert : sous-étage arbustif relativement dense
Au printemps, les mâles tambourinent: ce comportement leur permet d'attirer les femelles et de défendre leur territoire. S'effectue habituellement sur un gros billot, une grosse souche ou une grosse roche.



ÉLEVAGE


Période : juin à septembre
Domaine vital moyen : 13 ha
Composition forêt : feuillue et jeune
Hauteur des arbres : < 7 m
Densité du couvert : forte en sous-étage (> 75 %), près d'ouvertures.
Ce type de milieu offre une grande abondance d'insectes pour les poussins durant les premières semaines de vie, et des petits fruits plus tard.




AMÉNAGER
SON BOISÉ EN
MAINTENANT LA
BIODIVERSITÉ




Afin d'éviter trop de déplacement, créer une mosaïque de peuplements rapprochés correspondant aux différents habitats saisonniers.




Conserver les habitats d'élevage (régénération dense) ou appliquer des mesures d'atténuation aux travaux d'éclaircie pré-commerciale.



Maintenir 25 à 75 % d'essences résineuses dans les habitats de tambourinage et d'abri.



Coupe totale ou de jardinage par trouée (> 1 ha) pour recréer des ouvertures nécessaires à l'habitat d'élevage.



Maintenir des arbustes fruitiers (framboisier, sureau, sorbier, etc.) pour l'alimentation.



Voir recommandations des fiches Débris ligneux, Milieux ouverts et Forêts matures.

Illustrations : Sophie-Anne Vachon

Pour les références et en savoir plus, visitez foretprivee.ca/biodiversite



Réalisée
par

**GROUPEMENTS
FORESTIERS
QUÉBEC**

**CONSERVATION
DE LA NATURE
CANADA**

Ce projet a été réalisé avec l'appui financier de :



Collaborateurs
Alexandre Guay-Picard, ing.f., MRNF
Marc Champagne, Terra-bois
Marianne Cheveau, MELCCFP
Patrick Cartier, ing.f., FPFQ
Pierre Blanchette, consultant