



Tétras du Canada



environ 40 cm
450 à 550 g ♂
550 à 650 g ♀

CARACTÉRISTIQUES



- Mâle: poitrine et gorge noires, flancs barrés de blanc, ventre rayé noir et blanc et bout de la queue jaunâtre/roux, sourcils rouge vif et plumes sur les pattes;
- Femelle : plumage brun rouille, densément barré, queue foncée et courte se terminant par une bordure jaunâtre;
- Bec court et courbé;
- Se perche dans les arbres.

RÉPARTITION AU QUÉBEC

L'ensemble du Québec forestier, sauf à l'extrême sud de la province.



ALIMENTATION



- Différentes parties végétales d'arbustes;
- Feuilles et fleurs;
- Bleuets et myrtilles;
- Insectes;
- Poussins: Insectes, baies, champignons
- En automne: aiguilles de mélèze;
- En hiver: aiguilles de conifères, tels que le pin gris et les épinettes.



Mi-avril à fin mai



Fin mai à mi-juin

4-7 oeufs /année

Élevage des jeunes:
mi-juin à fin août


Cet oiseau ne migre pas



HABITAT

- Domaine vital moyen: 25 ha;
- Forêts de conifères boréales, dominées par l'épinette noire, le sapin baumier ou le pin gris;
- Tourbières forestières au sud du Québec;
- Forêts matures denses avec trouées;
- Il construit son nid au sol, caché sous les buissons.


AMÉNAGER
SON BOISÉ EN
MAINTENANT LA
BIODIVERSITÉ



Maintenir les peuplements résineux. Conserver le mélèze.



Favoriser la régénération de peuplements résineux dans le type d'intervention choisie.



Les femelles sont particulièrement vulnérables pendant qu'elles nichent. Éviter tout aménagement forestier durant cette période.

Illustrations : Sophie-Anne Vachon

Pour les références et en savoir plus, visitez foretprivee.ca/biodiversite



Réalisée
par



Ce projet a été réalisé avec l'appui financier de :



Collaborateurs

Alexandre Guay-Picard, ing.f., MRNF
Marc Champagne, Terra-bois
Marianne Cheveau, MELCCFP
Patrick Cartier, ing.f., FPFQ
Pierre Blanchette, consultant